


ELUTAN®:

Mejora la habilidad para el ejercicio,
disminuye los síntomas de la
Hipertensión Arterial Pulmonar
y retrasa el empeoramiento clínico

 **CASASCO**

Hipertensión Pulmonar



1

Es el aumento de la presión en las arterias pulmonares.

► **Arteria hipertensiva**


De no mediar tratamiento alguno, llevan a la aparición de insuficiencia cardíaca derecha.

2

Esto se produce por vasos sanguíneos que se estrechan, bloquean o destruyen.

Síntomas

- Dificultad para respirar
- Cansancio
- Dolor en el pecho
- Ritmo cardíaco acelerado
- Dolor en el abdomen
- Falta de apetito



Hipertensión Pulmonar

Incidencia anual

5 a 10 casos por
millón de personas

Prevalencia

Entre 15 y 60 casos
por millón de personas

80% de los casos son
de **sexo femenino**

La Hipertensión
Pulmonar
afecta a
1,6 / 100.000
personas



Presentación:

Comprimidos recubiertos **5 mg x 30**

Comprimidos recubiertos **10 mg x 30**

Posología y Método de Administración

ELUTAN® (ambrisentan) como agente único

El tratamiento de ELUTAN® (ambrisentan) debe ser iniciado con una dosis diaria de 5 mg. Se debe considerar incrementar de la dosis diaria a 10 mg si la dosis de 5 mg es tolerada.

ELUTAN® (ambrisentan) utilizado con PERDURAL® (tadalafil)

Cuando se utiliza en combinación con tadalafil, la dosis de ambrisentan debe ser titulada a 10 mg una vez al día.

Uso con ciclosporina A

Cuando se coadministra con ciclosporina A, la dosis de ELUTAN® (ambrisentan) debe limitarse a 5 mg administrados una vez al día.

Para más información, puede enviar un mensaje a nuestro equipo médico ingresando a la Web:
www.casasco.com.ar



Para acceder a más información
del producto, escanee este código QR