


# EN HIPERTENSIÓN PULMONAR



# Mesdam<sup>®</sup>

MACITENTÁN 10 mg

Para el tratamiento a largo plazo -en monoterapia o en combinación- de la **Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP)** en pacientes adultos clasificados como **clase funcional (CF) II a III** de la Organización Mundial de la Salud (OMS).




Las **guías ESC/ERS 2022** recomiendan para pacientes con **Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP)** de bajo o intermedio riesgo, el tratamiento inicial combinado con un **antagonista de los receptores de la endotelina (ARE)** y un **inhibidor de la fosfodiesterasa 5 (iPDE5)**. Recomendación clase IB.<sup>1</sup>

RECOMENDACIONES	CLASE	NIVEL
Se recomienda el tratamiento combinado inicial con ambrisentán y tadalafilo	I	B
Se recomienda el tratamiento combinado inicial con macitentán y tadalafilo	I	B
Se debe considerar el tratamiento combinado inicial con otros ARE e iPDE5	Ila	B
No se recomienda el tratamiento combinado inicial con macitentán, tadalafilo y selexipag	III	B

Recomendaciones de las **guías ESC/ERS 2022** sobre la secuencia del **tratamiento farmacológico combinado**. Recomendación clase IB.<sup>1</sup>

RECOMENDACIONES	CLASE	NIVEL
Evidencia generada por estudios con criterio de valoración principal compuesto de morbilidad / mortalidad		
La adición de macitentán a un iPDE5 o análogos de la prostaciclina orales o inhalados está recomendada para reducir el riesgo de eventos de morbilidad / mortalidad	I	B

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL MÉDICO




# Mesdam<sup>®</sup>

MACITENTÁN 10 mg

## Macitentan 10 mg una vez al día en el estudio de fase III **SERAPHIN**, demostró en pacientes con HAP en CFII, III y IV:


- Reducción de 45 % de la morbi-mortalidad a 2 años. (Objetivo primario)<sup>2</sup>
- Reducción de 50% de mortalidad u hospitalización por HAP. (Objetivo secundario)<sup>2</sup>
- Mejoró la **capacidad al ejercicio**<sup>2</sup> y la **calidad de vida**<sup>3</sup>
- Macitentan fue **bien tolerado**. Los eventos adversos más frecuentes fueron: nasofaringitis, cefalea y anemia.<sup>2</sup>

El estudio **SERAPHIN** de extensión abierto, es el de mayor seguimiento a largo plazo en pacientes con HAP, con estimados de **sobrevida para Macitentan de hasta 9 años**.<sup>4</sup>



Sobrevida en pacientes randomizados a Macitentan 10 mg (N=242)  
Curva de Kaplan-Meier de tiempo a mortalidad.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL MÉDICO



# Mesdam<sup>®</sup>

MACITENTÁN 10 mg

## INDICACIÓN

En monoterapia o en combinación para el tratamiento a largo plazo de la **Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP)** en pacientes adultos clasificados como clase funcional (CF) II a III de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

## DOSIS



1 comprimido  
(10 mg)



1 vez al día



con o sin  
alimentos



vía oral



no requiere  
titulación

## PRESENTACIÓN



**10 mg**  
30 comprimidos  
recubiertos

**PROSPECTO**  
hacer click

**REFERENCIAS** 1 - 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. European Heart Journal, Vol 43, Issue 38, 7 October 2022, 3618-3731. 2 - NEJM 2013; 369:809-818. 3 - Chest 2017 (1):106-118. 4 - Adv Ther (2022) 39:4374-4390.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL MÉDICO