

Información importante para pacientes

Este medicamento contiene **Macitentán y Tadalafilo** y se utiliza para tratar la Hipertensión Arterial Pulmonar.

- **NO use MESDAM®T si está embarazada.**
- **Este medicamento puede dañar gravemente al bebé por nacer.**



MUJERES EN EDAD FÉRTIL

- Debe realizarse una **prueba de embarazo** antes del inicio del tratamiento y, posteriormente, de forma mensual durante toda su duración.
- Debe usar **métodos anticonceptivos eficaces** durante todo el tratamiento.
- Informe inmediatamente a su médico si cree que puede estar **embarazada**.

CONTROLES MÉDICOS REGULARES

Durante el tratamiento se realizarán:

- Análisis de sangre para controlar glóbulos rojos.
- Controles de función hepática.
- Evaluaciones clínicas periódicas.

CONSULTE DE INMEDIATO A SU MÉDICO SI PRESENTA

- Falta de aire repentina
- Hinchazón de piernas o abdomen
- Cansancio extremo
- Mareos o desmayos
- Coloración amarilla de piel u ojos
- Sangrados inusuales



USO CORRECTO

- Tome **MESDAM®T** exactamente como fue indicado.
- No suspenda el tratamiento sin consultar previamente.
- Informe a su médico todos los medicamentos que esté utilizando.



Si presenta cualquier síntoma o molestia inesperada durante el tratamiento con **Mesdam®T**, contacte a su médico o comuníquese con el área de Farmacovigilancia de Laboratorios Casasco S.A.I.C. o con el Sistema Nacional de Farmacovigilancia de la ANMAT.