

NOXAPAL®

Dextrometorfano Bromhidrato 20 mg
Quinidina Sulfato 10 mg



INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Usted está en tratamiento con **NOXAPAL®**. Este medicamento contiene dextrometorfano y quinidina y puede interactuar con otros medicamentos.

Lleve siempre esta tarjeta con usted y muéstrela a cualquier médico o profesional de la salud que lo atienda.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Informe siempre que está tomando **NOXAPAL®**.
- No inicie nuevos medicamentos sin consultar previamente con su médico.
- Algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de alteraciones cardíacas o interacciones medicamentosas.
- No consuma alcohol durante el tratamiento

CONSULTE INMEDIATAMENTE A SU MÉDICO SI PRESENTA:

- Desmayos o pérdida de conocimiento
- Palpitaciones o latidos irregulares
- Mareos intensos
- Erupciones cutáneas
- Dificultad para respirar

NOXAPAL®

Dextrometorfano Bromhidrato 20 mg
Quinidina Sulfato 10 mg

INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Paciente en tratamiento con:

NOXAPAL®

Dextrometorfano bromhidrato 20 mg / Quinidina sulfato 10 mg

ADVERTENCIAS RELEVANTES

- Riesgo de prolongación del intervalo QT.
- Potencial de interacciones medicamentosas por inhibición de CYP2D6.
- Precaución con inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO).
- Precaución con ISRS, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos y antiarrítmicos.
- Precaución con otros medicamentos que prolonguen el intervalo QT.

Ante síntomas compatibles con síndrome serotoninérgico, suspender el tratamiento y evaluar clínicamente.

Notificación de eventos adversos

Por favor informe sobre cualquier efecto colateral asociado a **NOXAPAL®** comunicándose con Laboratorios Casasco: 4632-0858 o en la página web www.casasco.com.ar/farmacovigilancia.